


# Clé des poacées courantes de la vigne à l'état végétatif

Clé de haut en bas	Prolongement vers l'arrière de la base du limbe formant 2 lobes	Languelette au-dessus de la jonction gainelimb	Position de la jeune feuille en phase de croissance	Sorte de prolongement de la feuille entourant la tige / Renflement de la tige entre deux feuilles	Abréviations: f = feuille; inf = inférieur(e); sup = supérieur(e); pt(e) = petit(e); svt = souvent; méd = médian(e); rar = rarement	en mm	Couleur(s), pilosité générale, caractéristique particulière, type de colonie, inflorescence	Vivace	Mois de flor			Attention: non exhaustif, surtout si hors vigne !
	Oreillettes	Ligule [mm]	Préfol.	Gaine (G) / Nœud (N)	Feuille	Largeur feuille	Apparence générale	Viva	Flor	Nom latin	Nom français	Confusion possible avec
1. Présence d'oreillettes	Oui, latérales ciliées	Absente ou <1	Pliée	Glabre. Inf. brun rougeâtre, se décomposant en fibres	Caulinaire sétacée (section en V), dures avec rainures. Dépliable sans se casser	0.6-0.8	Vert, Glabre. Stolons courts. Plante en gazons vastes.	Oui	6-9	<i>Festuca rubra</i>	Fétuque rouge	<i>F. ovina</i>
	Oui, latérales ciliées	<1	Pliée	Ouverte sur presque toute la longueur	Courte, très étroite, caulinaire sétacée (à section ovale). Se déchire si dépliée	0.3-0.5	Verte à vert grisâtre	Oui	5-8	<i>Festuca ovina</i>	Fétuque ovine	<i>F. rubra</i>
	Oui, falciform non ciliée	<1 membraneuse, verdâtre	Enroulée	Glabre, se redresse en arc de cercle	Conique, molle, limbe lisse, Sup. un peu sillonnée. En partie carénée. Face inf. très légèrement luisante	3-8	Verte à vert foncé, lavée de rose à la base. Sans stolons.	Oui	5-7	<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés	<i>F. arundinacea</i> ; si végétatif: <i>Lolium</i> , <i>Elymus repens</i>
	Oui, falciform nettement ciliée	1	Enroulée	Scabre	Robuste, rigide, sillonnée en face supérieure; face inf. un peu luisante. F. en partie carénée seulement	6-10	Vert foncé. Grandes touffes grossières. Plante dure et scabre.	Oui	6-7	<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque faux roseau	<i>F. pratensis</i> ; si végétatif: <i>Lolium</i> , <i>Elymus repens</i>
	Oui	0.5 - 1	Enroulée	Gén. glabre, lisses. Sup. svt un peu renflées	Sup. mate, un peu sillonnée, pubescente. Inf. un peu luisante, gén. glabre	3-5	Vert, tige genouillée-ascend., en touffe: rameuse dès base. Racine sent le moisi (patate)	Non	5-8	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	<i>Elymus repens</i>
	Oui, falciformes étroites et pointues	~ 1	Enroulée	Variable. Nœuds allongés (5-7 mm)	Généralement glabre, sup. parfois pubescente à p.blancs. Face sup à sillons scabres. Nerv. transluc. à contre-jour. Rigides et torsadées, bords coniques Δ (#   )	3-12	Vert. Possède des stolons souterrains, présence de "dents" dures. Face large de l'épillet tourné contre l'axe de l'épi. Epillets aristés.	Oui	6-7	<i>Elymus repens</i> ( <i>Agropyron repens</i> )	Chiendent rampant, Gramon	<i>Lolium perenne</i> , <i>Arrhenatherum</i> , <i>Bromus inermis</i> , <i>Festuca arundinacea</i>
	Oui, falciformes glabres	1-2	Pliée	Glabre, un peu comprimées	Glabre, carénée. Sup. nett. sillonnée. Inf. luisant/gras. Bords parallèles	3-4	Vert à vert foncé, Glabre. Tige rougeâtre à la base (enlever vieilles f.). Face étroite de l'épillet tourné contre l'axe de l'épi. Epillets non aristés.	Oui	6-9	<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass anglais, Ivraie vivace	<i>Elymus repens</i> , <i>L. multiflorum</i> ; si végétatif: <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>F. pratensis</i> .
	Oui, falciformes glabres	1-2, fine, trans-lucide	Enroulée	Glabre	Glabre, carénée. Sup. nett. sillonnée. Inf. nett. luisant. Feuilles dressées, mais pendantes à l'extrémité	3-10	Vert à vert foncé. Souvent rose à la base. Face étroite de l'épillet tourné contre l'axe de l'épi. Epillets aristés.	Non	6-9	<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie, Ivraie à fleurs nombreuses	<i>L. perenne</i> , <i>Elymus repens</i> ; si végétatif: <i>F. pratensis</i>
2. Ligule = anneau de poils	Non	Anneau de poils à la place	Enroulée	Glabre	F. courtes et raides. Longs cils à la base. Poils courts et épars, voire quasi absents	2-4	Vert grisâtre, formant des gazons à stolons ramifiés. "Dents de chien" à la base. 3-6 épis digités "verticillés".	Oui	7-9	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied de poule	<i>Digitaria</i>
	Non	Anneau de poils à la place	Enroulée	Glabre comprimée	Poils de 2 à 7 mm, étalés, à pte verrues à la base. Rainure méd. bien marquée	6-10	Vert grisâtre. Gaine parfois rougeâtre à la base. Panic. cylindr. dense, à soies scabre	Non	7-9	<i>Setaria pumila</i> ( <i>S. glauca</i> )	Sétaire glauque	
	Non	Anneau de poils à la place	Enroulée	G. poilue seul, sur le haut. Non comprimée	Glabre, à bords blancs denticulés, scabre.	3-8	Verte. Tige mince, genouill.-ascend. G. parfois rougeâtre à la base.	Non	7-9	<i>Setaria viridis</i>	Sétaire verte	
3. Feuilles avec traces de ski	Non	2-3.5 décurrence sur gaine	Pliée	Glabre	Glabre, molle. Traces de ski, Pointe carénée. Svt ondulées "ridées"	1-3	Petite taille. Tige radicante aux nœuds inf. Panicule moins large que longue (1.5-5 cm).	Non	1-12	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	<i>P. supina</i> (VS)
	Non	<1	Pliée	Gén. glabre, inf. un peu comprimée	Glabre, molle. Traces de ski, Pointe nett. carénée: capuche. Bords parallèles	3-5	Vert foncé, souvent glaucescente. Forme gazons par stolons souterrains.	Oui	5-6	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	
	Non	Très longue (< 6) et pointue	Pliée	Glabre	Glabre, molle. Traces de ski. Inf. très luisante, bords non parallèles, pointe conique Δ	1-3	Rougeâtre à la base, stolon aérien formant un feutre à odeur de moisi	Oui	6-7	<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	<i>P. pratensis</i>
4. Plante glabre	Non	3-6 laciniée	Enroulée	Glabre	Glabre. Nettement sillonnée. Assez courte. Plate et rigide	2-6	Glaucue, glabre. Tiges et nœuds rougeâtres vers le bas. N. inf. radic. Stolons aériens.	Oui	6-7	<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	<i>A. gigantea</i>
	Non	1.5-3 obtuse, verdâtre	Enroulée	Gaine glabre, renflée	Glabre. Face sup. prof sillonnée	3-6	Vert clair, glabre, tiges dressées ou genouill.-ascend. Panic. cylindr. dense et étroit.	Non	5-9	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	
	Non	0.5-2.5, verdâtre - brunâtre, ciliée	Enroulée	Lisse sous l'épi, carène un peu décurrence sur la gaine	Très longue, scabre sur bords et svt aussi faces. Face sup. à sillons irréguliers et bande méd. large	6-10	Vert foncé, glabre, restes brun-rouge, de gaines sèches sur base. Panic. cyl. dense et "larg.	Oui	5-7	<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	<i>Arrhenatherum</i> , <i>Phleum</i> , <i>Cynosurus</i>
	Non	1-2 blanche	Enroulée	Glabre, carène décurrence sur la gaine avec collerette claire	Sup. à poils courts et fins rar. glabre (passer doigts) léger. sillonnée	4-7	Vert clair de grande taille, tige dressée	Oui	6-7	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	<i>Alopecurus</i> , <i>Trisetum</i>
	Non	3-5, souvent laciniée	Pliée	Glabre, Fortement comprimée, carène décurrence sur la gaine	Glabre, souvent ondulée. Fortement carénée. Pointe en bateau. Sillons peu marqu.	5-15	Claire, vert grisâtre, glabre. En touffes denses, sans stolons. Epis agglomérés caractéristiques.	Oui	5-6	<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré	<i>Sesleria</i> , <i>Poa chaixii</i>
	Non	Pratiqu. aucune	Enroulée	Glabre, aplatie (un peu comprimé bi-convexe)	Glabre. Large nervure médiane blanche, sans nervure latérale nette	6-14	Vert, mat, glabre, svt lavée de rouge. Tige robuste. Epillets groupés en forme de doigts.	Non	7-9	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Echinochloa pied de coq	<i>Panicum</i> , <i>Sorghum</i>
	Non	2-3 (blanc); 2 dents latérales	Enroulée	G. glabre, peu ou à peine renflée	Torsadée à bord ondulé. Sup. fin. sillonnée, très scabre 2 faces, bords blancs denticulés	4-8	Glaucue, cirée. Base tige enfl. Panicule cyl, dense, glabre, allongée, continue qd pliée	Oui	6-8	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	<i>Arrhenatherum</i> , <i>Alopecurus</i> , <i>Cynosurus</i>
	Non	< 2, faibl. laciniée	Pliée	Poils mous et denses	Bordée de longs cils raides et étalés. Sup. longs p. épars. Non prof. sillonnée	2-4	Vert, en touffes ± denses. Panicule multilat., rameaux scabres, dressés.	Oui	5-6	<i>Bromus erectus</i>	Brome dressé	<i>Koeleria pyramidata</i>
5. Plante pubescente	Non	< 2, parfois faibl. laciniée	Enroulée	G. à poils mous et denses, longs et courts; N. + larges que longs à poils denses et courts	Pubescente, sillons peu marqués	5-7	Vert grisâtre à poils mous. Panicule multilatérale, raide, dressée, contractée.	Non	5-6	<i>Bromus hordeaceus</i> ( <i>B. mollis</i> )	Brome mou	<i>Holcus</i> sp.
	Non	2-4 dentée à laciniée	Enroulée	G. pubescente, à p. mous très courts	Pubescente sur les 2 faces, face inf. un peu luisante	4-5	Vert frais, panicule multilatérale, rameau à 1-2 épillets	Non	5-7	<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile	<i>B. tectorum</i>
	Non	2.5-5 laciniée	Enroulée	G. densément pubescente, à p. mous longs et courts	Pubescente, finement ciliée	3-4	Vert jaunâtre ou vert; panicule unilatérale, ram. à 4-10 épillets	Non	4-6	<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits	<i>B. sterilis</i>
	Non	1	Enroulée	Sup. renflée, pubescente. Inf. un peu aplaties. Nœuds poilus.	Pubescente: velues-ciliées, souvent teintées de pourpre	6-10	Vert foncé, gén. lavé de rouge. Pousses svt radic. Tige surtout couchée. Infloresc. à gén. 3-4 épis digités "alternés"	Non	7-9	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	<i>Cynodon dactylon</i>
	Non	2-3 finement denticulée	Enroulée	G. veloutée à poils mous; N à poils mous courts rég.	Veloutée à poils mous	5-8	Vert clair à vert blanchâtre, sans stolons. Base des tiges blanchâtres, nerv rouge-violet	Oui	5-8	<i>Holcus lanatus</i>	Houque laineuse	<i>Bromus hordeaceus</i> , <i>H. mollis</i>

# DESCRIPTION D'UNE GRAMINÉE



## PRINCIPAUX CRITERES DE RECONNAISSANCE

### A) forme de la tige et préfoliation

- tige arrondie et préfoliation enroulée  
Ex : Fléole des prés  
Crételle, Fétuques  
Bromes, Fromental  
Vulpin, Agrostide  
Ray-Grass d'Italie
- tige plate et préfoliation pliée  
Ex : Pâturins  
Dactyle
- tige ovale et préfoliation pliée  
Ex : Ray-Grass  
Anglais

### B) ligule

- ligule absente ou très courte  
Ex : Pâturin des prés
- ligule ciliée ou remplacée par une rangée de poils  
Ex : Panic,  
Chiendent pied de poule
- ligule membraneuse  
Ex : Fléole des prés  
Dactyle, Agrostide  
Crételle, Fromental  
Bromes

### C) oreillettes



Ex.: Fétuque élevée  
ou Fétuque des prés  
Ray Grass

### pas d'oreillettes



Ex.: Brome dressé - Houlique laineuse  
Fétuque rouge - Canche - Crételle  
Vulpin des prés - Fromental  
Agrostide

### D) limbe

• pilosité :



FEUILLE VELUE  
Ex.: Bromes, Avoine jaunâtre  
Houlique laineuse  
Flouve odorante




FEUILLE GLABRE  
Ex.: Agrostide, Fétuque élevée et  
Fétuque des prés, Ray-Grass,  
Vulpins.

• nervation :



LIMBE UNI  
A BORD LISSE  
Ex.: Pâturin des prés



LIMBE NERVURE  
A BORD LISSE  
Ex.: Ray Grass anglais